

Annexe 4 : composition de la pharmacie d'école

Produits d'usage courant :

- Chlorhexidine aqueuse 0,2% en unidoses : nettoyage et antiseptie des plaies superficielles peu étendues, jeter le flacon après usage
- Compresses stériles 20x20
- Pansements adhésifs hypoallergéniques prêts à l'emploi
- Sparadrap hypoallergénique
- Bandes de gaze coton de 5 cm et 10 cm pour réaliser des pansements avec les compresses stériles
- Bandes de contention en crêpe type Velpeau 5 et 10 cm pour assurer une contention d'une cheville ou d'un poignet
- Tampons relais compressifs stériles de 6 et 10 cm
- Filets tubulaires pour pansements taille 2, 3 et 5 type Surgifix pour maintenir des pansements sur des zones particulières (coude, genou, tête)
- Echarpe triangulaire pour immobilisation du membre supérieur
- Une couverture isothermique
- Des gants à usage unique
- Une paire de ciseaux
- Un thermomètre frontal
- Un coussin multi-zones type Nexcare ColdHot (poche de froid instantané 15x18cm 2 packs) pour réduire œdèmes et formation d'hématomes
- Une pince à écharde
- Une lampe de poche
- Alcool à 70° pour désinfection du petit matériel après son lavage

Recommandations :

- Il faut disposer d'un container pour les pansements souillés.
- Le matériel et les produits doivent être rangés dans une armoire prévue à cet effet et fermée à clé.
- Ils doivent être vérifiés et renouvelés si besoin (matériel détérioré ou produits périmés)

Annexe 4 : composition de la pharmacie d'école

- Il faut favoriser les petits conditionnements pour éviter le stockage prolongé et la péremption.
- Le coton est à proscrire car **il y a un risque d'adhésion à la plaie et il n'est pas stérile.**
- **Les antiseptiques colorés sont également à proscrire car ils masquent les lésions.**
- **Avant la réalisation d'un soin, il convient de faire un lavage soigneux des mains et de mettre des gants.**
- **La pharmacie de l'école ne doit pas contenir d'autres produits que ceux mentionnés dans la liste ci-dessus.**